

# CT造影剤検査を受けられる方へ

恵佑会札幌病院で使用している造影剤は『非イオン性尿路・血管造影剤』です

## 【造影剤副作用について】

※ 安全な薬ですが、体調や体質により以下の症状が現れることがあります

- ① 《軽度》（100人に3～4人の割合）  
嘔気 蕁麻疹 発疹 むくみ かゆみ 頭痛 めまい 発熱 咳 鼻閉等
- ② 《中等度》（約6千人～1万人に1人の割合）  
処置が必要な血圧の低下 呼吸困難 広汎な蕁麻疹等
- ③ 《重篤な症状》（約3万人～20万人に1人の割合）  
緊急処置を必要とする重篤なショック症状
- ④ 《遅発性アレルギー》（1時間～数日後）  
発疹 発熱 悪心 めまい 胸内苦悶感等

検査中に症状が出た場合には、早急に対処致します

## 【前処置.指示等】

- ① 胆嚢の検査の場合は予約時間が午前の場合、朝食及び水分不可  
（牛乳などの乳製品も不可）  
予約時間が午後の場合、朝食以降絶飲食、その他の部位では前処置ありません。
- ② 予約時間の30分前には恵佑会にて受付を済ませてください
- ③ 当日は必ず申込用紙下部の『恵佑会札幌病院からのご連絡』をお持ちください
- ④ 遅発性アレルギーと思われる症状が現れた場合には、速やかに連絡するようご指示  
ください

## 【アクセス】



札幌市白石区本通14丁目北1-1 TEL 011-863-8800