

CT造影剤検査を受けられる方へ

恵佑会札幌病院で使用している造影剤は『非イオン性尿路・血管造影剤』です

【造影剤副作用について】

※ 安全な薬ですが、体調や体質により以下の症状が現れることがあります


- ① 《軽度》（100人に3～4人の割合）
嘔気 蕁麻疹 発疹 むくみ かゆみ 頭痛 めまい 発熱 咳 鼻閉等
- ② 《中等度》（約6千人～1万人に1人の割合）
処置が必要な血圧の低下 呼吸困難 広汎な蕁麻疹等
- ③ 《重篤な症状》（約3万人～20万人に1人の割合）
緊急処置を必要とする重篤なショック症状
- ④ 《遅発性アレルギー》（1時間～数日後）
発疹 発熱 悪心 めまい 胸内苦悶感等

検査中に症状が出た場合には、早急に対処致します

【前処置.指示等】

- ① 胆嚢の検査の場合は予約時間が午前の場合、朝食及び水分不可
（牛乳などの乳製品も不可）
予約時間が午後の場合、朝食以降絶飲食、その他の部位では前処置ありません。
- ② 予約時間の30分前には恵佑会にて受付を済ませてください
- ③ 当日は必ず申込用紙下部の『恵佑会札幌病院からのご連絡』をお持ちください
- ④ 遅発性アレルギーと思われる症状が現れた場合には、速やかに連絡するようご指示
ください

【アクセス】



社会医療法人
恵佑会札幌病院

札幌市白石区本通9丁目南1-1

TEL 011-863-8800(地域医療連携室直通)

最寄りの交通機関は、

白石本通8丁目バス亭下車 徒歩7分

地下鉄東西線南郷7丁目下車 3番出口徒歩10分

病院正面に駐車場もございます(有料)